

**MEDDELANDEN AF  
SOCIETATIS PRO FAUNA  
ET FLORA FENNICA**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649102624

Meddelanden af Societatis pro Fauna et Flora Fennica by Various

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.  
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

[www.triestepublishing.com](http://www.triestepublishing.com)

**VARIOUS**

**MEDDELANDEN AF  
SOCIETATIS PRO FAUNA  
ET FLORA FENNICA**





# MEDDELANDEN

A F

SOCIETAS

PRO FAUNA ET FLORA FENNICA.

FEMTE HÄFTET.

HELSINGFORS,  
J. SIMELIT ARFVINGARS TRYCKERY,  
1880.



Innehåll:

Lindberg, S. O. Musei nonnulli scandinavici . . . . .	Sid. 1.
Karsten, P. A. Symbolae ad Mycologiam fennicam, VI . . . . .	2 15.
* Pyrenomyces aliquot novi . . . . .	2 47.
* Quaedam ad Mycologiam addenda . . . . .	2 52.
Skifflingar, iakttagna i Mustiala trakten den 3 November 1878 . . . . .	2 57.
Brenner, M. Berättelse till Societas pro Fauna et Flora fennica öfver en 1869 i Kajana och Norra Österbotten verkställt botanisk resa . . . . .	2 63.
Leopold, G. Anteckningar öfver vegetationen i Salalahti, Kuhmalahti och Imopois kapellor af Södra Tavastland . . . . .	2 81.
Hellström, Fr. Förteckning öfver i Gamlakarleby provinsialläkare-distrikta fauna Fröträdter och Ormbunkar . . . . .	2 131.
Reuter, O. M. Nya bidrag till Ålands och Åbo skärgårds Hemipter-fauna . . . . .	2 160.
Sælan, Th. Om de i Finland förekommande formerna af slägget Tilia . . . . .	2 237.
* Om det Sibiriska Lärktrefdet . . . . .	2 246.
* Beskrifning öfver Impatiens parviflora DC. . . . .	2 249.
* Några sällsynliga växter observerade under en excursion till Sörnäs lastageplats vid Helsingfors i början af Oktober 1878 . . . . .	2 251.



(Meddel. af Societas pro Fauna et Flora fennica, 5: 1879.)

## MUSCI NONNULLI SCANDINAVICI

DESCRIPTI

A

S. O. LINDBERG.

(Societati exhibitum die 8 Novembris 1879.)

### 1. *Seligeria subimmersa* Lindb.

*Autoica*, densissime et pulvinate caespitosa; *caulis* dichotomus; *folia* nigra, fragilia, e basi elliptica vel oblonga fere sensim subulata, obtusinervula, cellulis angularibus numerosis, magnis, rufo-brunneolis; *bracteae* perichaetii grandes, os thecae plus minusve attingentes; *seta* brevis, crassa, lenissime curvatula; *theca* elliptica, collo magno; *dentes* acuti, extus optime eristato-trabeculati; *operculum* maximum, longitudine fere tota thecae, oblique rostratum.

Fennia, prov. Kuusamo, in rupe ad Kitkajoki,  $66^{\circ} 20'$  lat. bor., Aug. 19, 1867 parcissima specimina detexit amic.

Fr. Silén.

*Caespites* ad 1 cm. alti, densissimi, pulvinati, nigri, solis apicibus summis luteolo-viridibus, subopaci. *Caulis* flexuosulus, dichotomus, densissime foliatus. *Folia* siccata irregulatiter curvata, accrescentia, infima minima, sat fragilia, e basi erecta patentia, inferne elliptica vel oblonga, fere sensim subulata, subula flexuosula et superne distinete incurvata, basi carinato-canaliculata, subula tamen canaliculata, margine plano

et integerrimo, nervo inferne sat angusto et bene effigurato, superne sensim magis magisque latiore, crassiore et non effigurato, partem superiorem subulae solo formante, apice summo obtusiusculo et plano-convexo; *cellulae* omnes laevissimae, angulares numerosae et magnae, haud incrassatae, rufo-brunneolae (h. e. perfecte dieranaceae), in strato singulo, supra-basilares subquadratae, minutae, bene incrassatae, eadem in subula minutissimae et quadratae. *Bracteae perichaetii* numerosae, multo majores, accrescentes, os thecae plus minusve attingentes, e basi alte convolutaceo-vaginante et erecta abrupte subulatae, inferne laxissime et brunneolo-, superne incrassate et viridi-areolatae, subula angustiore magisque a nervo formata. *Vaginula* oblonga, laxe texta, a tribus vel quatuor pistillidiis et paraphysisibus filiformibus circumdata. *Seta* 1—1,5 mm. alta, crassa, erecta, lenissime tamen curvatula, straminea, laevissima. *Theca* 0,5 mm. alta, opaca, luteo-viridis, ore rubella, elliptica, sicca sub ore sat magno leniter contracta, laevissima, collo fere dimidium thecae longo, ex ipsa theca nullo modo, sed e seta bene definito, plicato, stomata paucissima superficialia in jugis gerente, cellulae exothecii magnae, valde irregulariter rectangulares, parum incrassatae. *Annulus* nullus. *Peristomii* dentes sedecim, purpureo-rufi, dolabriliformes, acuti, incurvi, siccii optime reflexi, laevissimi, circiter decem-articulati, et extus altissime cristato-trabeolati. *Columella* crassissima. *Spori* minutissimi, flaviduli, hyalini, laevissimi. *Operculum* maximum, longitudine fere tota thecae, rufum, nitidum, semigloboso-conicum, abrupte rostratum, rostro obliquo et acutiusculo. *Calyptra* magna, culata, inferne lutea, medio aurea, apice brunneola, laevissima, nitida. — *Androecium* apicale in ramo, e ejus axilla ramulus femineus postea exit, fuscum, minutum, gemmaceum; *bracteae* tres, convolutae, cochleari-concavae, rotundae et breviter

triangulari-acutatae, obtusiusculae, integerrimae, nervo tenui, bene effigurato, fere continuo, cellulae magnae, subrectangulares, laxissimae, summis distincte incrassatis exceptis; *antheridia* circiter sex, magna, duas partes bractearum alta, oblonga, aetate brunnescentia, brevissime stipitata, paraphyses ejusdem numero, filiformes, multiarticulatae, antheridia parum superantes.

E proxima spitsbergensi *S. polari* Berggr. pulcherrime distineta his notis: planta omnibus partibus multo minor, theca valde breviseta et inter bracteas fere immersa, elliptica etc. E *S. setacea* (Dill.; Wulf.) Lindb. jam caespite alto et denso et caule dichotomo-ramoso differt.

E ceteris speciebus generis distinguntur hae *S. polaris* et *subimmersa* caespite alte pulvinato et denso cauleque dense ramoso, cellulis angularibus foliorum vero dieranaceis, quibus notis se ad *Blindiam* valde appropinquant, ex hoc genere certe distinctae vix alia nota quam dentibus extus dense cristato-trabeculatis, et novum subgenus *Seligeriae*, quod *Blindiadelphum* nominare volumus, constituentes; naturalius forsitan videatur *Blindiam* cum *Seligeria* conjugi, qua de re tamen nondum perfecte certi sumus.

Denominationes antiquissimae *S. setacea* sunt, secundum specimina archetypa in herb. Dillenii: *Muscus trichoides omnium minimus palustris, capitulis plurimis acutis vel Muscus capillaris omnium minimus palustris serotinus, capitulis plurimis acutis, visum ferme fugientibus Richards. Ms. (Mart. 1722); Bryum trichoides acutum palustre minimum, setis et capsulis brevissimis Dill. Hist. musc., p. 387, n. 53, tab. 49, fig. 53 (1741); Bryum paludosum L. Sp. pl., 1 ed., 2, p. 1119, n. 20 (1753).*

## 2. *Hypnum (Brachythecium) latifolium* Lindb.

*Dioica*, nitida, recta apiceque acutissima — acuta, irregulariter remoteque subpinnata — subsimplex, ramis brevi-